

■ ■ ESSENCIAL vs. SEGURANÇA

INTERAÇÕES DA CANETINHA

*Mounjaro seguro com seus outros remédios.
Contraindicações, hipoglicemia, exames.*

CAPÍTULO 1

Quem não pode usar

Contraindicações absolutas



Quem NÃO deve usar canetinha

Contraindicações absolutas

- » História pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide.
- » Síndrome de neoplasia endócrina múltipla 2 (MEN-2).
- » Pancreatite prévia.
- » Gestação ou amamentação.
- » Alergia ao princípio ativo.

Cuidado redobrado

- » Doença renal grave.
- » Insuficiência hepática grave.
- » Gastroparesia conhecida.
- » História de cálculo de vesícula.
- » Distúrbio alimentar ativo.

“Canetinha não é remédio para todo mundo. Avaliação médica antes de iniciar.”

CAPÍTULO 2

Interações importantes

Remédios que conversam com a canetinha



Interações principais

Diabetes — risco de hipoglicemia

- » **Insulina:** reduzir dose em 10–20% ao iniciar.
- » **Sulfonilureia** (glibenclamida, glimepirida): reduzir ou suspender.
- » **Glinida:** reduzir.

Anticoncepcionais orais

- » **Esvaziamento gástrico lento** pode reduzir absorção.
- » Considere **método contraceptivo adicional** nos primeiros 4 semanas de início e após cada subida de dose.

Antibióticos e remédios orais

- » Tome **1 hora antes** da canetinha para garantir absorção.

Anticoagulantes (varfarina)

- » **Monitorar INR** mais frequentemente.